Capture d'un probable jeune Tisserin gendarme *Ploceus cucullatus* par un Héron strié *Butorides striata*

Jean-Pierre Blanchet

Le 7 février 2016, je me trouve au lac Baringo (Kenya), en compagnie de trois amis photographes animaliers. Il est presque 16 h et nous venons d'embarquer. Le lac Baringo, situé au cœur du Grand Rift africain, abrite plus de quatre cents espèces d'oiseaux nicheurs. Jonas, notre guide natif des bords du lac, est aux commandes.

J.-P. Blanchet

Quelques séquences de la scène, peu après la capture du jeune tisserin par le Héron strié *Butorides striata*. Lac Baringo (Kenya), 7 février 2016.

Toujours à l'affût d'un comportement à documenter, nous sommes interpellés par un compagnon qui, tout à coup, s'écrie « *en silence* » : Prédation ! Prédation ! Un Héron strié[1] vient de s'emparer d'un jeune tisserin – peut-être jeune Tisserin gendarme – fraîchement émancipé ! L'attaque surprise n'a duré qu'un instant et nous ne pouvons qu'observer le fait accompli. Sur la branche d'un arbuste, le Héron strié retient dans son bec sa proie, qui crie et se débat désespérément. Comme l'aurait fait un martin-pêcheur avec un poisson, le héron entreprend d'assommer l'oiseau sur une branche.

Notre guide, avec une précaution infinie, cherche un endroit d'où il nous sera possible de bien observer la scène. Il stabilise l'embarcation pas trop loin, tout en gardant une distance suffisante pour ne pas déranger l'animal. Le lac a subi une forte montée des eaux depuis quelques années et contient une multitude d'arbustes et de buissons à demi immergés, refuges de

[1] Ndlr – Le Héron strié est un petit héron, de taille légèrement supérieure à celle d'un Blongios nain *Ixobrychus minutus* et de distribution essentiellement intertropicale en Afrique, Asie et Amérique. Il chasse à l'affût sur des branches partiellement immergées et se nourrit de poissons, amphibiens, arthopodes, mollusques, vers, petits reptiles et parfois de micromammifères. En somme, il fait preuve d'un bel opportunisme en fonction de ce qui passe à portée de son bec. Vu sa technique de chasse, ce n'est *a priori* guère le cas d'oiseaux ! (beP)

J.-P. Blanchet

Le Héron strié *Butorides striata* trempe le jeune tisserin à plusieurs reprises dans l'eau avant de l'avaler. Lac Baringo (Kenya), 7 février 2016.

nombreux oiseaux. Pendant plusieurs minutes, le héron trempe sa proie dans l'eau avant de finalement l'avaler. Ayant précédemment tué l'oiseau en l'assommant, le héron n'a donc vraisemblablement pas l'intention de le noyer. Je suppose que c'est plutôt pour l'engloutir plus facilement. Alors que Jonas guide des ornithologues et amateurs de photographies autour du lac depuis plus de vingt ans, il n'avait encore jamais observé ce comportement !

Summary **A probable young Village Weaver caught by a Striated Heron *Butorides striata*.** On 7 February 2016 while visiting Lake Baringo (Kenya) a Striated Heron was seen to capture a young weaver (possibly a Village Weaver *Ploceus cucullatus*). For Striated Heron to hunt birds is no doubt an exception. While the capture itself was not photographed, the aftermath was documented. (Translation : M. Bowman)

Jean-Pierre Blanchet, Av. de Longueville 4, CH–2013 Colombier
blanchetfleurs@net2000.ch